Flunarizine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於預防偏頭痛。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 可能需要數週才能完全見效。
2. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
3. 請勿服用超過醫師指示的劑量。 服用過量劑量可能會提高出現嚴重副作用的機率。
4. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：肌肉僵硬、顫抖或肌肉動作異常、憂鬱症、心神不定、感覺極為乏力或虛弱、乳頭分泌物、經期改變。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-487-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Flunarizine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 避光乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-487-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您