Sumatriptan

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療偏頭痛。
2. 此藥用於治療叢集性頭痛。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 曾經發生使用此藥後出現高血壓的案例。
2. 此藥並非用於預防或減少偏頭痛發生次數。
3. 若您出現與通常偏頭痛不一樣的頭痛，在服用此藥前應洽詢醫師並徵得同意。
4. 服用此藥若超過醫生囑咐的量（較高劑量、較多頻率），可能會使頭痛變得更嚴重。
5. 若您有罹患心臟病的危險因素(高血壓、高膽固醇、體重超重、高血糖症或糖尿病、吸菸、40 歲以上的男性、其他家族成員有早期心臟病病史、更年期後的女性)，請洽詢醫師建議。
6. 已有服用此藥後幾個小時內出現重度心臟疾患的罕見病例發生。 若您出現任何下述癥狀，應立即致電醫師求助：胸部、喉嚨、頸部或下巴有緊縮感、疼痛或壓抑感；突然直冒冷汗；呼吸短促；心跳極快；心跳異常；或重度頭暈或暈厥。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-543-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Sumatriptan

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

7. 很少發生服用此藥後出現嚴重且有時致命的腦血管疾病（如中風）。若您身體某一側變得虛弱、說話或思維困難、平衡感改變、臉部某一側下垂，或視力變化，請立即聯絡您的醫師。



8. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛。

9. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：感覺頭暈、想睡、疲倦或虛弱、臉潮紅、發熱感、噁心或嘔吐。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 需要時才使用此藥。 服用次數勿超過醫師囑咐次數。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。請勿冷存或冷凍。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。避光。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-543-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您