Empagliflozin and Metformin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥的作用是減低糖尿病患者的血糖含量。
2. 此藥用於減少某些人因心臟病而死亡的機會。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 若您的血糖一直偏低，請勿開車。否則發生意外的危險性會增加。
2. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應緩慢地站起。
3. 曾經發生使用此藥後出現血脂肪異常症（高膽固醇）的案例。若您有任何疑問，請諮詢醫師。
4. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗和檢查血糖。
5. 在經歷發燒、感染、受傷或進行手術等對身體造成負擔的情形時，可能更難以控制血糖。身體活動、運動或餐食改變可能也會影響血糖。
6. 於高熱天氣或動態活動時。喝大量的水以防止脫水。
7. 若您無法透過嘴巴喝飲料或感覺胃部不適、嘔吐或持續不斷的腹瀉，您須避免脫水。脫水可能會引發新的腎臟問題或加劇。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-561-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Empagliflozin and Metformin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

8. 曾發生血酸或尿酸濃度過高（酮酸中毒（酮酸症））以及嚴重的泌尿道（尿路）感染 (UTI)。酮酸中毒（酮酸症）可能會致命。這兩種情況都可能需要住院接受治療。
9. 曾出現腎臟疾病。有時可能需要住院或透過透析治療腎臟疾病。
10. 當您開始服用此藥時，出現胃部問題，例如胃部不適、嘔吐或腹瀉是正常現象。若您在治療階段末期有胃部問題。這可能是血液中酸性疾病（乳酸血症）的徵象。
11. 對已達生育年齡而尚未排卵的女性，會有懷孕可能。若您希望避免懷孕，在服用此藥期間採用避孕方法來避孕。
12. 如果您在懷孕時服用此藥物，可能會傷害腹中胎兒。
13. 使用此類藥物曾出現一種罕見的重度感染。這種感染可能是致命的。若您的生殖器或您的生殖器和直腸之間的區域變得觸痛、發紅或腫脹，並且您出現發燒或感覺不適，請立即尋求醫療協助。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-561-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Empagliflozin and Metformin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：鼻或咽喉刺激、氣體、胃痛、感覺疲倦或虛弱、頭痛。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-561-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您