Ketotifen

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療或預防氣喘。
2. 勿使用此藥治療氣喘發作。 應使用急救用吸入型藥物。 請與醫師商洽相關事項。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 可能需要數週才能完全見效。
2. 若您的呼吸問題惡化、急救吸藥器沒有發揮作用，或需要使用急救吸藥器的頻率提高，請立即致電聯絡醫師。
3. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
4. 請勿在未致電諮詢開藥醫師的情況下停用此藥。
5. 曾經很少發生使用此藥後出現癲癇發作的情形。若您出現癲癇發作，請告知您的醫師。
6. 在您知道此藥會如何對您產生影響之前，請暫時不要做需要保持警覺性的作業或活動。 這類作業和活動包括騎腳踏車（自行車）、體育運動；或使用剪刀、割草機、電動輪椅、玩具車，或機動車輛。
7. 酒精可能對此藥藥效產生影響。
   確保您不飲酒。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-581-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Ketotifen

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：嗜睡、體重增加、感到激躁、口乾、眩暈、感覺緊張、容易興奮、無法入睡、噁心、頭痛。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘早服用錯過的藥物。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 禁止同時服用2劑或額外劑量

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-581-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您