Ketorolac

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於減輕疼痛。
2. 此藥僅適用於短期疼痛（總共最多 5 天）。如果服用超過 5 天可能會造成不安全的副作用。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 若患有哮喘，請洽詢醫師。
2. 可能會更容易出血。
3. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。 您將必須討論對嬰兒造成的風險。
4. 若您正接受 aspirin（阿斯匹靈）預防心臟病發作，請與您的醫師詳細商洽。
5. 使用此類藥物會提高心臟衰竭的機會。對於心臟衰竭患者，則會提高心臟病發作、因心臟衰竭而須就醫以及死亡的機率。請洽詢您的醫師。
6. 服用此藥曾出現肝臟疾病。若出現肝臟問題徵候，請立即醫師求助；這類徵候包括像是尿液暗色、疲倦、無飢餓感、胃部不適或胃痛、大便淡色、嘔吐，或者皮膚或眼睛泛黃。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-582-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Ketorolac

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

7. 如同此藥的非類固醇類消炎藥 可能會影響女性的排卵。 懷孕時服用此藥物，可能會傷害腹中胎兒。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：鼻子疼痛或不適、流鼻水、咽喉刺激。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 假如您定期使用此藥物，一旦錯過使用，請在想起時立即使用。如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
2. 請勿在同一時間使用 2 次劑量或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放在室溫下，避免陽光直射。儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。切勿冷凍。
2. 將藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-582-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您