Levetiracetam

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療癲癇。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 在飲酒或服用其他會造成您行動遲緩的藥物和天然滋補品前，請告知您的醫師。
3. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
4. 若開始用此藥後癲癇發作情況加重或有所改變，請告知醫師。
5. 若未事先得到醫師同意，勿突然停用此藥。 出現癲癇發作的風險可能增高。 若需停用此藥，應按醫師指示逐步緩慢地減少劑量直至停用。
6. 曾經發生使用此藥後出現稱作血管性水腫的嚴重反應。有時，這可能會危及生命。徵候可能包括雙手、顏面、嘴唇、雙眼、舌或喉嚨腫脹; 呼吸困難; 吞嚥困難; 或嗓音異常嘶啞。如果您有以上任何症狀，請立即尋求醫療協助。
7. 若你是 65 歲或 65 歲以上，使用此藥時要小心。你可能會有較多的副作用。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-605-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Levetiracetam

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

8. 用於兒童時須小心。 請與醫師商洽相關事項。
9. 四歲以下孩童將需要經常檢查血壓。請和醫師討論。
10. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。
11. 懷孕期間此藥的效果可能減弱。請洽詢您的醫師。

三. 副作用為何？

1. 胃痛或腹瀉、感覺頭暈、想睡、疲倦或虛弱、鼻或咽喉刺激、入睡困難、頭痛、噁心或嘔吐、無饑餓感、流感樣症狀。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-605-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Levetiracetam

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放在室溫下，儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將防止藥物受熱及暴露於光線下。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-605-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您