Linezolid

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療細菌感染。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 服用此藥曾出現血球計數減少反應。可能導致出血問題、感染或者貧血。如果您有發燒、發冷或喉嚨痛等感染症狀；任何無法解釋的瘀傷與出血；或感到十分疲倦或虛弱，請立即致電您的醫師。
2. 若您患有苯酮尿症 (PKU)，請告知您的醫生。某些藥品含有苯丙胺酸 (phenylalanine)。
3. 曾經發生使用此藥後出現高血壓的案例。遵照醫師指示進行血壓檢測。
4. 若您服用此藥物時接觸特定的食物和飲料，如奶酪和紅酒，可能會突發嚴重的高血壓。
5. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。
6. 若您有糖尿病，請洽詢醫師。此藥可能降低血糖。治療高血糖的藥物可能需做調整。
7. 此藥曾引發嚴重的眼睛問題。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-607-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Linezolid

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：頭痛、腹瀉、胃部不適或嘔吐。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放在室溫下，避免陽光直射。儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。鎖緊上蓋。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-607-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您