Lithium

製定日期：102年9月11日
修定日期：110年1月13日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 該藥用於治療雙相障礙。
2. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 發燒、感染、嘔吐、腹瀉或大量流汗或高熱天氣活動時，要喝大量的水防止脫水，因為可能改變此藥在血液中的含量。
3. 有高血糖症狀：意識惑亂、嗜睡、口渴感增強、飢餓、頻尿、潮紅、呼吸急促或呼吸中帶有水果氣味等，請告知您的醫師。
4. 可能會發生稱為血清素症候群的問題，出現：情緒急躁、平衡感改變、意識混亂、幻覺、發燒、心跳過快或異常、潮紅、肌肉抽搐或僵硬、癲癇發作、發抖或顫抖、大量出汗、嚴重腹瀉、胃部不適或嘔吐或重度頭痛的情況，請聯絡您的醫師。
5. 曾出現顱內壓增高和眼睛腫脹，有重度頭痛、耳鳴、視力模糊、重影或者喪失視力，請聯絡您的醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-612-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Lithium

製定日期：102年9月11日
修定日期：110年1月13日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

6. 有腎臟問題症狀：如無法排尿；排尿量改變；血尿、棕色尿或泡泡尿；呼吸短促或咳嗽；臉、腳或手浮腫或腫脹，請立即致電聯絡您的醫師
7. 懷孕時服用此藥物或以母乳餵養幼兒，可能會傷害腹中胎兒，請和醫師商洽。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：感覺頭暈、想睡、疲倦或虛弱、噁心、無饑餓感、胃痛、更多唾液、口乾、頭痛、毛髮乾燥或過細、掉頭髮、味覺能力的改變、關節痛等
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早服用忘記用的藥，如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次，切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫乾燥處。 不要儲存在浴室。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-612-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您