Loratadine and Pseudoephedrine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥的作用是治療鼻塞。
2. 此藥用於減輕過敏癥狀。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 請勿服用超過醫師指示的劑量。 服用過量劑量可能會提高出現嚴重副作用的機率。
2. 服用此藥時，請勿超過醫師指示的時間長度。
3. 用於兒童時須小心。未先與醫師確認前，請勿給 12 歲以下的兒童使用此藥。
4. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。 您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。
5. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。 您將必須討論對嬰兒造成的風險。
6. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
7. 服用此藥時避免飲酒。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-608-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Loratadine and Pseudoephedrine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：眩暈、感覺緊張、容易興奮、無法入睡、嗜睡。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四.如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎么辦？

1. 假如您定期服用此藥物，錯過服用時請在想起時立即服用。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
4. 該藥可使用數次，需要時即可使用。服用次數勿超過醫師囑咐的次數。

五.我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 避光乾燥處。不要儲存在浴室。
3. 將藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-608-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您