Lurasidone

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥的作用是治療精神分裂症。
2. 此藥用於治療雙極性精神失調（躁鬱症）患者的情緒低落（憂鬱症）問題。
3. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。
3. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
4. 曾發生使用此類藥物後出現高血糖症或糖尿病、高膽固醇與體重增加的案例。這些可能會提高心臟與腦血管疾病的機率。
5. 請遵照醫師指示檢查您的血糖。
6. 勿吃葡萄柚或喝葡萄柚汁。
7. 服用此藥時避免飲酒。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-611-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Lurasidone

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

9. 於高熱天氣或動態活動時，請務必小心。 喝大量的水以防止脫水。
10. 使用此藥時可能會感到頭暈、嗜睡或平衡感變差。這些症狀可能會導致跌倒，從而導致骨折或其他健康問題。

11. 服用此藥曾出現白血球計數偏低的問題。這可能會導致感染的機率升高。若您出現感染徵候，例如發燒、發冷或喉嚨痛，請致電聯絡您的醫師。
12. 患癡呆症的老年成人使用類似此藥的藥物後，有出現中風次數增多的病例發生。有時，這類副作用可能危及生命。此藥尚未獲准用於治療因癡呆症引起的精神疾患。
13. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。
14. 若於懷孕後期服用此藥，可能會導致新生兒出現無法控制的肌肉活動和戒斷症狀。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-611-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Lurasidone

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 感覺頭暈、想睡、疲倦或虛弱、心神不定、噁心或嘔吐、入睡困難、感覺緊張、容易興奮、腹瀉、口乾、體重增加、流鼻水。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起錯過的藥物，即應儘早隨食物吞服。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
4. 若您忘記用藥且不確定該如何做時，請致電聯絡醫師。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-611-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您