Benserazide and Levodopa

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療帕金森氏症 (Parkinson's disease)。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。
2. 可能需要數週才能完全見效。
3. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
4. 若您患高血糖（糖尿病），將需密切觀察您的血糖變化。
5. 遵照醫師指示接受眼壓和視力檢查。
6. 此藥可能會影響某些實驗室檢驗。告知所有醫療照護提供者和實驗室人員您正在服用此藥。
7. 巴金森氏病（帕金森氏症）病患罹患一種皮膚癌（稱作黑色素瘤）的風險會增高。此藥是否也會增高此風險，尚有待查證。
8. 若您下一劑給藥間隔較近，此藥可能"藥效消失"。若發生此情況並讓您困擾，請洽詢醫師如何因應。
9. 在飲酒或服用其他會造成您行動遲緩的藥物和天然滋補品前，請告知您的醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-641-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Benserazide and Levodopa

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

10. 您的唾液、尿液或汗液可能呈深色（紅色、棕色或黑色）。這對身體無害，但可能會沾染您的衣服。
11. 若你是 65 歲或 65 歲以上，使用此藥時要小心。你可能會有較多的副作用。
12. 如果您在懷孕時服用此藥物，可能會傷害腹中胎兒。在服用此藥期間，採用您信任的避孕方法來避孕。



三. 副作用為何？

1. 可能包括：噁心或嘔吐、腹瀉。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下、避光、鎖緊上蓋，儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-641-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您