Mequitazine

製定日期：102年9月11日
修定日期：110年1月13日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於減輕過敏症狀。
2. 此藥用於治療蕁麻疹。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 避免飲酒或食用含有酒精成分的藥物。
3. 服用其他會造成您行動遲緩的處方藥或非處方藥之前，請先諮詢醫師。
4. 你很容易曬傷。避免陽光、太陽燈和日曬床照曬。使用防曬乳液；穿防曬的衣物和太陽眼鏡。

5. 服用此藥曾出現白血球計數偏低的問題，若出現感染症狀：發燒、發冷或喉嚨痛，請聯絡您的醫師。
6. 若您已 65 歲或以上，使用此藥時須小心。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-657-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Mequitazine

製定日期：102年9月11日
修定日期：110年1月13日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：口乾、嗜睡、感覺疲倦或虛弱、眩暈、加重口渴、感覺緊張、容易興奮、無法入睡、便秘等。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 假如您定期服用此藥物，錯過服用時請在想起時立即服用。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間，切勿一次服用兩倍或額外劑量。
3. 該藥可使用數次，需要時即可使用。服用次數勿超過醫師囑咐的次數。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 避光。
3. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-657-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您