Pyridostigmine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療重症肌無力 (myasthenia gravis)。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 使用劑量不要超過處方規定量。可能出現嚴重反應，包括死亡。
2. 此藥未核准用於兒童身上。不過，醫師可能會判定使用此藥的益處可能大於其風險。若醫師為您的孩子使用此藥，應洽詢醫師瞭解其益處與風險的詳情。



1. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：噁心或嘔吐、胃痙攣、腹瀉、更多唾液、瞳孔縮小、出汗過多、肌肉痙攣、抽搐、心動過緩。
2. 這些沒有涵蓋所有的可能的副作用。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-645-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Pyridostigmine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 於室溫下儲存在乾燥處。
2. 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-645-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您