Magnesium Oxide

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療或預防低血鎂。
2. 此藥用於治療胃灼熱和胃部不適。
3. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 除非有醫務人員的指示，否則服藥請勿超過2週。
2. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。 您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。
3. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。 您將必須討論對嬰兒造成的風險。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：腹瀉、腸胃刺激。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-649-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Magnesium Oxide

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-649-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您