Morphine

製定日期：102年9月11日
修定日期：110年1月13日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於減輕疼痛。
2. 是較為強效的止痛藥，可以配合病人需求調升劑量，減少突發性的疼痛出現的頻率，獲得較好的生活品質；較為弱效的止痛藥(例如：Tramdol)不能達到此目的且有較多副作用。



二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 服藥後止痛開始時間約是用藥後的0.9小時；持續時間約為11~13小時，孕婦拉長約43小時，幼兒則為2~9小時。
2. 應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
3. 醫師為您同時開立此藥和止痛貼劑時，是長短效藥物互相搭配，可以讓疼痛獲得更好的控制。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate Micromedex

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Morphine

製定日期：102年9月11日
修定日期：110年1月13日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

4. 長期或定期使用類鴉片藥物（如此類藥物）可能會導致藥物依賴性。不可以突然降低劑量或停用此藥。若您疼痛加劇、情緒改變、有自殺的想法或任何其他不良反應，請告知您的醫師。
5. 長期使用類鴉片藥物可能會導致性荷爾蒙降低。如果您的性慾降低、有生育問題、無月經或性能力改變，請告知醫師。
6. 此藥會提高部分病患癲癇發作的機率，包括過去曾癲癇發作的病患。
7. 如果您在懷孕時服用此藥物，或正以母乳餵養幼兒，請告知醫師。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：感覺頭暈、想睡、疲倦或虛弱、口乾、便秘、腹瀉、胃痛、胃部不適、嘔吐或飢餓感降低、頭痛、焦慮、出汗過多等。
2. 如果發生呼吸困難等嚴重副作用時，請告知醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate
Micromedex

T-C-0210-ED-656-04

Morphine

製定日期：102年9月11日
修定日期：110年1月13日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 短效藥：
   a. 假如您定期服用此藥物，錯過服用時請在想起時立即服用.
   b. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
   c. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
   d. 該藥可使用數次，需要時即可使用。
   服用次數勿超過醫師囑咐的次數。
2. 所有長效型藥錠：
   a. 跳過未服的藥物，繼續按照您的療程服藥。
   b. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放在室溫下，避免陽光直射。儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate Micromedex

T-C-0210-ED-656-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您