Moxifloxacin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療細菌感染。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
3. 請勿持續服用超過指示期間。可能會發生二次感染。
4. 你很容易曬傷。避免陽光、太陽燈和日曬床照曬。使用防曬乳液；穿防曬的衣物和太陽眼鏡。

5. 使用此類藥物曾出現高血糖和低血糖的情形。大多數時候，服用降低血糖的藥物（如胰島素）的糖尿病病患出現了低血糖。嚴重低血糖導致昏迷，有時甚至導致死亡。請遵照醫師指示檢查血糖。
6. 若您有高血糖或低血糖的症狀，如呼吸中帶有水果氣味、頭昏、呼吸急促、心動過速、意識惑亂、嗜睡、感覺虛弱無力、潮紅、頭痛、口渴感或飢餓感增強、頻尿、顫慄或出汗等，請告知您的醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-324-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Moxifloxacin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

9. 很少有服用此藥後出現嚴重且有時致命的作用。包括肌肉或關節、腎臟、肝臟、血液或其他問題。若您尚有任何疑問，請洽詢醫
10. 若出現肝臟問題徵候，請立即致電醫師求助；這類徵候包括像是尿液暗色、疲倦、無飢餓感、胃部不適或胃痛、大便淡色、嘔吐，或者皮膚或眼睛泛黃。
11. 曾在使用此藥後出現某一類型的心跳異常(QT 間期延長)。若有心跳過速、心跳異常現象，或者若您暈厥，請立即聯絡醫師。



12. 此藥尚未獲核准用於 18 歲以下未成年人。請和醫師討論。
13. 如果您在懷孕時服用此藥物，可能會傷害腹中胎兒。若在服用此藥期間您懷孕或試圖懷孕，應立即致電醫師商洽。
14. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。 您將必須討論對嬰兒造成的風險。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-324-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Moxifloxacin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：噁心、腹瀉。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎么辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 每日使用此藥物勿超過 1 次。

五.我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-324-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您