Neomycin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於預防腸道手術期間發生感染。
2. 該藥用於減輕肝昏迷的症狀

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 請勿持續服用超過指示期間。可能會發生二次感染。
2. 用於兒童時須小心。 請與醫師商洽相關事項。
3. 若你是 65 歲或 65 歲以上，使用此藥時要小心。你可能會有較多的副作用。
4. 如果您在懷孕時服用此藥物，可能會傷害腹中胎兒。若在服用此藥期間您懷孕或試圖懷孕，應立即致電醫師商洽。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：噁心或嘔吐、腹瀉。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-684-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Neomycin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-684-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您