Nifedipine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療某些類型的胸痛（心絞痛）。
2. 此藥物的某些劑型未核准用於治療高血壓。
3. 此藥可能因其他原因而給您服用。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。
3. 雖然比較罕見，但在初次使用此藥或增大此藥劑量時，可能出現胸痛加劇和心臟病發作風險。
4. 請遵照指示檢查您的血壓。
5. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。
6. 勿吃葡萄柚或喝葡萄柚汁。

7. 若您正服用此藥並有高血壓，在使用可能引起血壓升高的非處方藥前，先洽詢醫師。這些藥包括咳嗽或感冒藥、減肥藥、興奮劑、布洛芬 (Ibuprofen) 或類似的止痛藥。
8. 曾經發生服用此藥的長效型後出現嚴重的胃腸問題，像是阻塞和潰瘍。
9. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-304-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Nifedipine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：感覺頭暈、疲倦或虛弱、頭痛、臉潮紅、胃灼熱、噁心、感覺緊張、容易興奮。
2. 長效緩釋藥錠：**您的糞便中可能會殘留藥錠殼**。對於這些品牌的藥物，這是正常現象，無需擔憂。

1. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎么辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放在室溫下，避免陽光直射。儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-304-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您