## Nirmatrelvir and Ritonavir

製定日期:111年05月18日

- 一. 此藥有哪些作用?
  - 1. 此藥在某些人中用於治療 COVID-19
- 二. 使用此藥必須注意哪些事項?
  - 1. 需每天2次早晚服用,飯前或飯後皆可。
  - 2. 該產品是兩種藥物,打開鋁箔後,內含2顆粉紅色 錠劑和1顆白色錠劑,3顆錠劑為一次劑需同時服用。



3. 考量您的腎功能,藥師已經為您裁剪包裝,內含1 顆粉紅色錠劑和1顆白色錠劑,2顆錠劑為一次劑需 同時服用。



4. 將藥整粒吞服。勿嚼碎、弄破或搗碎。即使病情好 轉,仍應按指示用藥完成5天療程。

1

**Last Reviewed Date** 2020-03-03 UpToDate T-C-0210-ED-691-04

## **Nirmatrelvir and Ritonavir**

製定日期:111年05月18日

## 三. 副作用為何?

- 1. 味覺能力的改變、腹瀉、肌肉疼痛。
- 2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作 用有疑問,請聯絡您的醫師。
- 四. 如果我忘記(錯過)一次用藥,該怎麼辦?
  - 1. 儘早把忘記用的藥用了。
  - 2. 若錯過用藥時間已超過 8 小時,則跳過錯過的劑量, 隨後恢復正常用藥時間。
  - 3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

## 五. 我應該如何儲存此藥?

- 1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
- 2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒 童和寵物都無法觸及的地方。
- 3. 扔掉未使用或過期的藥物。

