Oxcarbazepine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於協助控制一些特定類型的癲癇發作。
2. 此藥可能因其他原因而給您服用。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
2. 服用如這種顛癇藥物的病患曾出現嚴重且有時致命的副作用。 若您出現腺體腫大；發燒；皮疹；胸痛；無法排尿或排尿量改變；或肝臟問題症狀，包括尿色深、感到疲倦、沒有飢餓感、胃部不適或胃部疼痛、糞便顏色不深、嘔吐或者皮膚或眼睛泛黃，請立即與您的醫師聯絡。
3. 曾經發生使用此藥後出現稱作血管性水腫的嚴重反應。有時，這可能會危及生命。徵候可能包括雙手、顏面、嘴唇、雙眼、舌或喉嚨腫脹; 呼吸困難; 吞嚥困難; 或嗓音異常嘶啞。如果您有以上任何症狀，請立即尋求醫療協助。
4. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
5. 避孕藥丸和其他利用荷爾蒙的避孕方法可能無法有效防止懷孕。 應使用保險套避孕。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-703-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Oxcarbazepine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

6. 如果您在懷孕時服用此藥物，可能會傷害腹中胎兒。若在服用此藥期間您懷孕或試圖懷孕，應立即致電醫師商洽。
7. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。 您將必須討論對嬰兒造成的風險。
8. 可能會發生嚴重的皮膚反應（史帝文生-強生症候群(Stevens-Johnson Syndrome)/毒性表皮壞死症 (toxic epidermal necrolysis)）。 可能會造成不會消退的嚴重健康問題，有時甚至致命。 若您有如皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮（無論有無發燒）；眼睛發紅或刺激；嘴部、喉嚨、鼻子或眼睛出現潰瘍等症狀，請立即尋求醫療協助。
9. 帶有某種基因 (HLA-B*1502) 的病患在使用這種藥物後發生嚴重且有時致命的皮膚反應的機率會更高。此基因在亞洲人群中更為普遍。若您有任何疑問，請告知醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-703-04

Oxcarbazepine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

3. 服用此藥的病患可能有較高的風險會產生自殺的想法或行為。若有憂鬱症、神經緊張、心神不定、抱怨不休、恐慌症發作，或情緒或行為產生變化或較以往更為嚴重時，請立即聯絡醫師。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：頭痛、感覺疲倦或虛弱、噁心或嘔吐、無饑餓感、腹痛、 眩暈、嗜睡、顫抖、感覺緊張、容易興奮、入睡困難、味覺能力的改變、腹瀉、便秘、普通感冒徵候。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
2. 將藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-703-04