Oxybutynin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療膀胱過動症。
2. 此藥可能因其他原因而給您服用。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動，直到您發現該藥的影響。
2. 於高熱天氣或動態活動時，請務必小心。 喝大量的水以防止脫水。
3. 曾經發生使用此藥後出現稱作血管性水腫的嚴重反應。有時，這可能會危及生命。徵候可能包括雙手、顏面、嘴唇、雙眼、舌或喉嚨腫脹; 呼吸困難; 吞嚥困難; 或嗓音異常嘶啞。如果您有以上任何症狀，請立即尋求醫療協助。
4. 良好口腔護理、用力吸吮、無糖糖果或嚼無糖口香糖，可舒緩口乾症狀。定期看牙醫。

5. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-704-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Oxybutynin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：感覺頭暈、想睡、疲倦或虛弱、視力模糊、頭痛、噁心、腹瀉或便秘口乾、入睡困難、感覺緊張、容易興奮。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放在室溫下，避免陽光直射。儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-704-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您