Selegiline

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療帕金森氏症 (Parkinson's disease)。
2. 此藥的作用是治療抑鬱症。
3. 此藥可能因其他原因而給您服用。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 為降低頭暈或昏厥的機率，
   若您已坐下或躺下一段時間，
   應非常緩慢地站起。
   上下樓梯時請小心。

3. 請勿在未告知醫師的情況下即突然停藥。 您可能會有較高的副作用發作風險。 您若需停用此藥物，應該按醫師囑咐緩慢停用。
4. 按照醫囑檢查血壓和心率。
5. 若您服用此藥物時接觸特定的食物和飲料，如奶酪和紅酒，可能會突發嚴重的高血壓。此藥物的藥效可能會致命。請向醫師索取一份忌用食物和飲料的清單。在停用此藥後醫師指示的一段時間內，請避免接觸這些食物和飲料。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-721-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Selegiline

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

6. 巴金森氏病（帕金森氏症）病患罹患一種皮膚癌（稱作黑色素瘤）的風險會增高。此藥是否也會增高此風險，尚有待查證。
7. 服用此藥時避免飲酒。

8. 一些病患在接受口服劑量的此藥後，即使正在執行一些活動（例如，駕駛、用餐或說話）期間，也會不由自主入睡。一些病患不會事先有睡意（困倦感）並可能感覺警覺敏銳，然後會突然入睡。即使接受此藥後一年內，也會發生此類危險事件。若您擔心在活動中睡著，在接受此藥期間，請避免駕駛或從事其他需引起警覺（注意力集中）的工作或活動。若發生了此種事件或者您白天感覺嚴重嗜睡，應立即致電醫師求助。
6. 若在服用此藥的同時一併接受其他特定藥物，則可能發生一種稱為血清素症候群的問題，有時會致命。若您有情緒急躁、平衡感改變、意識惑亂、幻覺、發燒、心跳異常、潮紅、肌肉抽搐、癲癇發作、發抖或顫抖、大量出汗、嚴重腹瀉、胃部不適或嘔吐或嚴重頭痛，請立即聯絡您的醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-721-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Selegiline

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

10. 若您患有苯酮尿症 (PKU)，請告知您的醫生。某些藥品含有苯丙胺酸 (phenylalanine)。
11. 若你是 65 歲或 65 歲以上，使用此藥時要小心。你可能會有較多的副作用。
12. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。 您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：眩暈、嗜睡、頭痛、口乾、噁心或嘔吐、入睡困難、腹瀉或便秘、鼻或咽喉刺激、背痛、流鼻涕或鼻塞。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-721-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Selegiline

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-721-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您