Triprolidine and Pseudoephedrine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1.此藥的作用是治療鼻塞。

2.此藥用於減輕過敏癥狀。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 服用過量劑量可能會提高出現嚴重副作用的機率。
2. 服用此藥時，請勿超過醫師指示的時間長度。
3. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。

4. 服用此藥時避免飲酒。
5. 用於兒童時須小心。此藥物可能無法用於所有年齡的孩童。該藥用於兒童之前，請先洽詢醫師。
6. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-723-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Triprolidine and Pseudoephedrine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：眩暈、感覺緊張、容易興奮、入睡困難、嗜睡。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎么辦？

1. 假如您定期服用此藥物，錯過服用時請在想起時立即服用。如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次藥量，隨後回到正常用藥時間。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
3. 該藥可使用數次，需要時即可使用。服用次數勿超過醫師囑咐的次數。

五. 我應該如何儲存此藥？

1.存放於室溫下。

2.儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。

3.將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-723-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您