Piracetam

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 用於治療一種肌肉抽搐（肌躍症）。
2. 此藥可能因其他原因而給您服用，請洽詢醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 若您正接受低鹽或無鹽餐，請告知醫師。
3. 您可能會更容易出血。小心避免受傷。使用軟毛牙刷和電動剃鬚刀。



4. 若您已 65 歲或以上，
   使用此藥時須小心。
   您可能會出現更多副作用。
5. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。
6. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。您將必須討論對嬰兒造成的風險。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-741-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Piracetam

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：感覺緊張、容易興奮、體重增加、噁心、腹瀉。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了，如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放在室溫下，避免陽光直射。儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-741-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您