Pirfenidone

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療特發性肺纖維化。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 你很容易曬傷。避免陽光、太陽燈和日曬床照曬。使用防曬乳液；穿防曬的衣物和太陽眼鏡。
2. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
3. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。
4. 在開始使用此藥前，請務必戒菸。避免在服藥時吸菸。抽菸可能會降低此藥的藥效。請洽詢醫師建議。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-787-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Pirfenidone

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：感覺頭暈、疲倦或虛弱、普通感冒徵候、頭痛、關節痛、味覺能力的改變、入睡困難、體重減輕、胃痛或胃灼熱。
2. 服用此藥後通常造成腹瀉、嘔吐、胃部不適和不易飢餓。若有這些狀況，請向醫師諮詢如何降低副作用。
3. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起錯過的藥物，即應儘早隨食物吞服。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
4. 若您 14 天以上未服用此藥，請在您重新開始服用前告知醫師。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。請勿冷凍儲存。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。

T-C-0210-ED-787-04

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您