Pitavastatin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於減少有害膽固醇並提升有益膽固醇 (HDL)。
2. 此藥用於減少三酸甘油酯。
3. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?



1. 若您患糖尿病，將需密切觀察您的血糖變化。
2. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。
3. 請勿服用超過醫師指示的劑量。 服用過量劑量可能會提高出現嚴重副作用的機率。
4. 遵照醫師建議的飲食和運動計畫。
5. 避免或限制飲酒量，一天不可超過 3 杯。
6. 飲酒過量可能增加罹患肝臟疾病的危險。
7. 此藥可能會對胎兒造成傷害。女士在服用此藥時必須使用避孕措施。若您懷孕了，請聯絡您的醫師。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：背痛、手臂或雙腿疼痛、腹瀉或便秘。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-728-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Pitavastatin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

四. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放在室溫下，避免陽光直射。儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-728-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您