
Propylthiouracil

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

- 一. 此藥有哪些作用?
 - 1. 此藥用於治療甲狀腺機能亢進症。
- 二. 使用此藥必須注意哪些事項?
 - 1. 在您明白該藥物對您的影響之前,應避免駕駛、進 行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
 - 您可能會更容易出血。小心避免受傷。使用軟毛牙刷和電動剃鬚刀。
 - 3. 用於兒童時須小心。 請與醫師商洽相關事項。
 - 4. 若您在懷孕時使用此藥物,可能會傷害或失去腹中胎兒。
 - 若在服用此藥期間您懷孕或 試圖懷孕,應立即致電醫師商洽。
 - 6. 若您正以母乳餵哺幼兒,請告 知醫師。您將必須討論對嬰兒造成的風險。



Last Reviewed Date 2020-03-03 UpToDate



T-C-0210-ED-737-04





Propylthiouracil

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何?

- 1. 可能包括:頭痛、噁心或嘔吐、腹痛、肌肉或關節痛、眩暈、嗜睡、掉頭髮、味覺能力的改變。
- 2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。
- 四. 如果我忘記(錯過)一次用藥,該怎麼辦?
 - 1. 儘早把忘記用的藥用了。
 - 2. 如已接近下一次用藥時間,則跳過錯過的那次用藥量,隨後回到正常用藥時間。
 - 3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
- 五. 我應該如何儲存此藥?
 - 1. 存放於室溫下。
 - 2. 儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
 - 3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒 童和寵物都無法觸及的地方。



T-C-0210-ED-737-04

