Propranolol

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療高血壓。
2. 此藥用於治療胸痛或胸悶。
3. 此藥用於協助特定心臟問題。
4. 此藥用於預防偏頭痛。
5. 此藥用於治療原發性顫抖症。
6. 此藥在心臟病發作後使用，以預防未來可能的心臟病發作並延長壽命。
7. 該藥用於嗜鉻細胞瘤的治療。
8. 此藥用於治療某些類型的心跳異常。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 按照醫囑檢查血壓和心率。
2. 若您吸煙，請洽詢醫師。
3. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
4. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-738-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Propranolol

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 使用此藥必須注意哪些事項?

5. 此藥物讓您難以判別是否出現甲狀腺功能亢進的症狀，如心動過速。若您有甲狀腺亢進的問題卻突然停藥，病情可能會加劇、甚至危及生命請洽詢醫師。
6. 若您正服用此藥並有高血壓，在使用可能引起血壓升高的非處方藥前，先洽詢醫師。這些藥包括咳嗽或感冒藥、減肥藥、興奮劑、布洛芬 (Ibuprofen) 或類似的止痛藥、某些天然草藥或補充劑等。
7. 若您曾經出現嚴重的過敏反應，請告知您的醫師。若是您接觸過敏源，有可能引發更加嚴重的反應。若您使用 epinephrine（腎上腺素）來治療嚴重的過敏反應，請和醫師洽談。當您正在使用此藥時，epinephrine可能無法充分發揮藥效。
8. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。
9. 此藥可能會隱藏低血糖症狀。 請與醫師洽談。
10. 若您患高血糖（糖尿病），將需密切觀察您的血糖變化。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-738-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Propranolol

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：頭暈、想睡、疲倦或虛弱、噁心、嘔吐、胃痛或痙攣、腹瀉或便秘、入睡困難、奇怪或怪異的夢。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 防止藥物受熱、受凍及暴露於光線下。
2. 儲存在室溫乾燥處。不要儲存在浴室。
3. 將藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-738-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您