Dapagliflozin and Saxagliptin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥的作用是減低糖尿病患者的血糖含量。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 可能出現低血糖。當此藥與其他糖尿病治療藥物併用時，這類風險會更高。症狀可能包括頭昏、頭痛、嗜睡或感覺虛弱無力、顫慄、心動過速、意識惑亂、飢餓感或出汗。若出現任何上述症狀，可服用葡萄糖錠、葡萄糖液或果汁。

2. 若您的血糖一直偏低，請勿開車。否則發生意外的危險性會增加。
3. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您的孩子已坐下或躺下一段時間，應讓孩子非常緩慢地站起。讓您的孩子上下樓梯時小心。
4. 曾經發生使用此藥後出現血脂肪異常症（高膽固醇）的案例。若您有任何疑問，請諮詢醫師。
5. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗並檢查血糖。
6. 於高熱天氣或動態活動時，請務必小心。 喝大量的水以防止脫水。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-761-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Dapagliflozin and Saxagliptin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

7. 與接受其他糖尿病治療藥物的病患相較，接受此藥的病患出現膀胱癌的發病率明顯更低。

8. 曾出現腎臟疾病。有時可能需要住院或透過透析治療腎臟疾病。

11. 曾有人在服用類似此藥的其他藥物後出現嚴重且有時致命的胰腺問題（胰臟炎）。

12. 此類藥物可能會導致劇烈且致殘的關節疼痛。若有劇烈的關節疼痛或沒有消失，請聯絡醫師。

13. 曾發生血酸或尿酸濃度過高（酮酸中毒（酮酸症））以及嚴重的泌尿道（尿路）感染 (UTI)。酮酸中毒可能會致命。這兩種情況都可能需要住院接受治療。

14. 使用此類藥物曾出現一種稱為大皰性類天皰瘡的皮膚反應。若您出現水泡，或者皮膚開始破裂，請到醫院檢查。

15. 使用此類藥物曾出現一種罕見的重度感染。這種感染可能是致命的。若您的生殖器或您的生殖器和直腸之間的區域變得觸痛、發紅或腫脹，並且您出現發燒或感覺不適，請立即尋求醫療協助。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-761-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Dapagliflozin and Saxagliptin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：呼吸道感染、泌尿道感染、血脂異常、頭痛、腹瀉、背痛、生殖器感染。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量，除非醫師另外指示。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-761-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您