Enalapril

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療高血壓。
2. 用於治療心力衰竭（心衰竭）。
3. 此藥用於某些心臟衰竭患者，
   降低因心臟衰竭惡化而須就醫的機率。
4. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。
3. 請遵照指示檢查您的血壓。
4. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
5. 若您正在使用含鉀的鹽替代品、留鉀性利尿劑或鉀補充劑，請告知您的醫師。
6. 若您正接受低鹽或無鹽餐，請告知醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-445-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Enalapril

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

8. 已有接受 captopril（卡特普）（一種與此藥相似的藥物）後引起白血球計數偏低的病例發生。這會導致受感染的風險升高。大多數情況下，患有腎臟疾病的病患，特別是同時患有其他一些特定健康問題的病患，發生感染的機率更高。若您出現感染徵候，例如發燒、發冷或喉嚨痛，請立即致電聯絡您的醫師。
9. 若您正服用此藥並有高血壓，在使用可能引起血壓升高的非處方藥前，先洽詢醫師。這些藥包括咳嗽或感冒藥、減肥藥、興奮劑、布洛芬 (Ibuprofen) 或類似的止痛藥、某些天然草藥或補充劑等。
10. 飲酒前，先洽詢醫師指示。
11. 於高熱天氣或動態活動時，請務必小心。
    喝大量的水以防止脫水。

12. 若您過度排汗、體液流失、嘔吐或稀便，請告知您的醫師。 這可能會導致低血壓。
13. 此藥對於黑人病患可能療效不佳。 請與醫師商洽相關事項。
14. 曾經發生稱作血管性水腫的嚴重且有時致命的反應。黑人病患出現血管性水腫的機率可能較高。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-445-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Enalapril

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：眩暈、咳嗽。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。請勿冷凍儲存。
2. 防止藥物受熱。
3. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
4. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-445-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您