Repaglinide

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥的作用是減低糖尿病患者的血糖含量。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 若您的血糖一直偏低，請勿開車。否則發生意外的危險性會增加。
2. 請遵照醫師指示檢查您的血糖。
3. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
4. 遵照醫師建議的飲食和運動計畫。
5. 在經歷發燒、感染、受傷或進行手術等對身體造成負擔的情形時，可能更難以控制血糖。身體活動、運動或餐食改變可能也會影響血糖。
6. 使用此藥可能引發血糖降低。 血糖過低可能導致癲癇發作、昏厥、長期腦部損傷，有時甚至致命。 請與醫師商洽相關事項。
7. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。 您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-783-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Repaglinide

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：頭痛、普通感冒徵候、腹瀉、關節痛、背痛。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘早隨用餐送服錯過的藥物。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-783-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您