Ribavirin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療 C 型肝炎感染。
2. 此藥可能可與干擾素或 peginterferon（長效型干擾素/珮格西施）併用。若您正在使用這些藥物中的其中一種，請閱讀隨附的病患資料表。
3. 此藥可能因其他原因而給您服用。



二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。可能需在開始使用此藥前及用藥期間接受心電圖 (ECG) 檢查。
2. 遵照醫師指示進行肺部功能檢查。請洽詢醫師建議。
3. 此藥並無法預防如人類免疫缺乏病毒 (HIV)（愛滋病毒）或肝炎等經由血液或性愛傳播之疾病的傳播。請勿在不使用膠乳或聚氨酯保險套的情形下進行任何形式的性愛。請勿共用針頭或其他如牙刷或刮鬍刀等物品。
4. 留意痛風發作。
5. 酒精可能使肝病惡化。
6. 嘔吐後請漱口。
7. 做好牙齒的健保。定期看牙醫。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-784-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Ribavirin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

8. 您有較高的機率會受到感染。 經常洗手。遠離受感染、感冒或流行性感冒的人。
9. 可能會發生嚴重的皮膚反應（史帝文生-強生症候群 (Stevens-Johnson Syndrome)/毒性表皮壞死症 (toxic epidermal necrolysis)）。 若您有如皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮（無論有無發燒）；眼睛發紅或刺激；嘴部、喉嚨、鼻子或眼睛出現潰瘍等症狀，請立即尋求醫療協助。
10. 在某些案例中，此藥會影響兒童和青少年的成長發育。孩子使用此藥後，體重可能發生變化，請告知醫師。此藥的劑量可能需要改變。
11. 此藥可能會影響生育能力。生育年齡女性病人，或者男性病人的女性性伴侶可能懷孕，使用此藥的期間及治療結束後的 6 個月內，持續每個月驗孕一次。
12. 如果您在未使用 2 種您能信賴的避孕方式下有過性行為、或覺得可能懷孕或您錯過預計經期，請聯絡醫師。



9. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-784-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Ribavirin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能發生入睡困難、便秘、腹瀉、胃痛、胃部不適、嘔吐或飢餓感降低、掉頭髮、肌肉或關節痛、眩暈、皮膚乾燥、口乾、體重減輕、感覺疲勞虛弱、流感樣症狀。 這包括頭痛、乏力、發熱、寒戰、疼痛和出汗。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 蓋緊蓋子，保存在室溫下。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-784-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您