Risperidone

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥的作用是治療精神分裂症。
2. 該藥用於治療雙相障礙。
3. 此藥用於治療自閉症所併發的刺激。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。
3. 曾發生使用此類藥物後出現高血糖症或糖尿病、高膽固醇與體重增加的案例。
   這些可能會提高心臟與腦血管疾病的機率。
4. 請遵照醫師指示檢查您的血糖。
5. 服用此藥時避免飲酒。
6. 若您患有苯酮尿症 (PKU)，請告知您的醫生。某些藥品含有苯丙胺酸 (phenylalanine)。
7. 使用此藥時可能會感到頭暈、嗜睡或平衡感變差。可能會導致跌倒、骨折等。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-788-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Risperidone

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

8. 服用此藥曾出現白血球計數偏低的問題。這可能會導致感染的機率升高。若您出現感染徵候，例如發燒、發冷或喉嚨痛，請立即致電聯絡您的醫師。
9. 部分患者可能會出現稱為遲發性運動障礙的嚴重肌肉問題。此問題可能在停用此藥後減緩或消失，但也可能不消失。糖尿病患者和年長者的風險可能較高，特別是年長女性。使用此藥物的時間較長或劑量越高，風險也會較高，但此類風險也可能發生在短期內使用低劑量後。若您難以控制肢體活動，或您的舌頭、顏面、口唇或頜（下巴）出現問題，例如舌頭外伸、雙頰鼓起、撅嘴或不自主咀嚼，請立即致電聯絡您的醫師。
10. 患癡呆症的老年成人使用類似此藥的藥物後，有出現中風次數增多的病例發生。有時，這類副作用可能危及生命。此藥尚未獲准用於治療因癡呆症引起的精神疾患。
11. 此藥可能會影響生育能力。停藥後將會恢復正常。
12. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。若於懷孕後期服用此藥，可能會導致新生兒出現無法控制的肌肉活動和戒斷症狀。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-788-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Risperidone

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：體重增加、心神不定、感覺頭暈、想睡、疲倦或虛弱、焦慮、便秘、腹瀉、胃痛、胃部不適或嘔吐、胃灼熱、口乾、增強食慾、流鼻涕或鼻塞、鼻或咽喉刺激、頭痛、入睡困難、背痛、肌肉疼痛。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 所有口服藥物：
   a. 存放在室溫下，避免陽光直射。儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 水劑：
   a. 請勿冷凍儲存。
3. 將藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-788-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您