Rivaroxaban

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於稀釋血液以免血液形成凝塊。
2. 此藥用於治療血液凝塊。
3. 用於減少某些人心臟病發作、中風與死亡的機率。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在進行某些手術前，需按照醫囑停用此藥。如果此藥被停用，您的醫師將在您手術後告訴您何時再次使用此藥。
2. 您會更容易出現出血。請格外小心且避免受傷。使用軟毛牙刷和電動刮鬍刀。在極罕見情況下，有些出血問題會使人致命。



3. 若您跌倒或不慎受傷，或者撞到頭部，請立即聯絡您的醫師。
4. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-790-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Rivaroxaban

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能發生出血。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

15 毫克，每天兩次服藥：

1. 立即補服遺漏的劑量，以確保您每天服用 30 mg。您可以同時服用2片。然後，後一天恢復到您正常的次數。
2. 若您直到第二天才想起錯過一次用藥，則跳過該次錯過的用藥量(不再補服)，之後回到正常用藥時間。

2.5 毫克每日兩次用藥：

1. 跳過未服的藥物，繼續按照您的療程服藥。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

所有其他劑量：

1. 一旦想起忘記服用的藥物，請在同一天儘早服用。
2. 若您直到第二天才想起錯過一次用藥，則跳過該次錯過的用藥量(不再補服)，之後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-790-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Rivaroxaban

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-790-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您