Rosuvastatin

此藥有哪些作用?

- 此藥用於減少有害膽固醇並提升有益膽固醇 (HDL)。
- 此藥用於減少三酸甘油酯。
- 此藥可抑制心臟病的發展。
- 此藥用於一些患者，以降低心臟病發作、中風和使用某些心臟手術的幾率。
- 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

我服用此藥「前」需告知醫生什麼？

- 若您對此藥、此藥的任何成分、任何其他藥物、食物或物質過敏。請務必告知您的醫師過敏情形及您出現過的癥狀。
- 若您患肝臟疾病或肝臟酵素升高。
- 若您正在服用 gemfibrozil（健菲布旨）。
- 如果您已懷孕或可能懷孕。 若您已懷孕，請勿服用此藥。
- 若您正以母乳餵哺幼兒。 使用此藥期間，請勿以母乳餵養幼兒。

這並不是一份會與此藥物交互影響的所有藥物或健康問題之清單。

告知您的醫師與藥劑師有關您的所有用藥（處方藥或非處方藥、天然滋補品、維他命劑）與健康問題。 務必確認在您的用藥與健康問題下服用此藥是安全的。 諮詢您的醫師前，請勿開始服藥、停藥或改變用藥劑量。

使用此藥必須注意哪些事項?

- 告知所有醫療照護提供者您正在服用此藥。這包括您的醫師、護理師、藥劑師和牙醫師。
- 曾經發生使用此藥後出現高血糖的案例。這包含新出現或惡化的糖尿病。
- 請遵照醫師指示檢查您的血糖。
- 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
- 請勿服用超過醫師指示的劑量。 服用過量劑量可能會提高出現嚴重副作用的機率。
- 遵照醫師建議的飲食和運動計畫。
- 避免或限制飲酒量，一天不可超過 3 杯。飲酒過量可能增加罹患肝臟疾病的危險。
- 服用此藥物至少 2 小時後，才能服用含鋁或鎂的制酸劑。
- 若您具亞裔血統，使用此藥時須小心。 您可能會有較多的副作用。
- 若你是 65 歲或 65 歲以上，使用此藥時要小心。你可能會有較多的副作用。

•此藥可能會對胎兒造成傷害。女士在服用此藥時必須使用避孕措施。若您懷孕了，請立即聯絡您的醫師。

立即告知醫務人員的原因

警告/小心： 即便極為罕見，有些人服用藥物時可能會有極為嚴重或甚至致死的副作用。 您若出現下列可能與極嚴重副作用相關的任何徵兆或症狀，請立即告知您的醫師或接受醫療協助：

•過敏反應的症狀有皮疹；蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。

•高血糖的症狀有意識惑亂、嗜睡、口渴感增強、飢餓、頻尿、潮紅、呼吸急促或呼吸中帶有水果氣味。

•尿中帶血。

•無法排尿或排尿量改變。

•此藥可能引起肌肉疼痛、觸痛或虛弱無力。 有時可能發生極重度肌肉問題並可能導致腎臟疾患。 接受與此藥類似的藥物並引致上述問題的極個別病患有出現死亡的病例發生。 若您出現異常肌肉疼痛、觸痛或虛弱無力（伴有或未伴發燒或心情沮喪），應立即致電您的醫師求助。 若醫師告訴您停用此藥後您仍持續出現上述肌肉徵候，應立即致電您的醫師求助。

•服用此藥曾出現肝臟疾病。有時候，可導致死亡。若出現肝臟問題徵候，請立即致電醫師求助；這類徵候包括像是尿液暗色、疲倦、無飢餓感、胃部不適或胃痛、大便淡色、嘔吐，或者皮膚或眼睛泛黃。

此藥物的其他副作用為何？

所有藥物皆可能引起副作用。 但有許多人沒有副作用，或是只有輕微的副作用。 假如任何一項副作用或其他任何副作用令您困擾或是不會消退，請致電您的醫師或接受醫療協助。

•頭痛。

•胃痛。

•噁心。

•關節痛。

•虛弱。

這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

您可以向您的國內健康機構通報您的副作用。

最佳的用藥方法為何?

請遵照醫師指示用藥。請詳閱所有的相關資訊。請嚴格遵照所有指示。

<u>所有劑型：</u>

•每日相同時間服用此藥。

•即使您感覺良好，您仍應持續按醫師或其他醫療照護提供者的指示服用此藥。

•將該藥是否與食物同服均可。

藥錠：

•用水或其他飲品整體吞服藥物。

分散型膠囊：

•吞服整片藥片。切忌咀嚼或咬碎。

•您若無法將藥整個吞服，可將其內容物撒在蘋果醬上。 若您這麼做，請立即吞服混合藥劑且不要咀嚼。

•配餵食軟管者可以使用此藥。遵照指示使用此藥。給予此藥後沖洗餵食軟管。

如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎么辦？

•儘早把忘記用的藥用了。

•如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。

•請勿同時服用兩劑藥物，或在 12 小時內分別服用。

我應該如何儲存此藥？

•於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。

•將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

•扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。您所在地區可能有藥物回收計劃。

一般聲明

•若您的症狀或健康問題未獲改善或變得更糟，請聯絡您的醫師。

•勿將您的藥物分給其他人吃，也不要吃其他人的藥。

•某些藥品可能擁有其他病患資訊說明書。若您對此藥有任何疑慮，請聯絡您的醫師、護理師、藥劑師或其他醫療保健提供者。

•您若認為出現用藥過量的狀況，請致電您的毒物控制中心或立即接受醫療照護。 請準備好告知或顯示服用藥物、服用量及發生時刻。