Dipyridamole

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥與薄血藥併用，在心臟瓣膜置換術後預防出現凝血。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 若您患有重症肌無力，服用此藥可能會讓重症肌無力 (myasthenia gravis) 惡化。若徵狀惡化，請致電聯絡醫師。
2. 若您有服用 aminophylline、theophylline（茶鹼）或任何包含咖啡因的藥物，請告知醫師。這些藥物會影響此藥的藥效。
3. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。
4. 若您將會接受心臟壓力試驗，請告知您的醫師。在進行心臟壓力試驗之前，您可能需要停止服用此藥。
5. 曾經發生使用此藥後出現心跳異常、呼吸困難、心臟病、癲癇發作與中風的情形。其中一些情形有致命危險。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-724-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Dipyridamole

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 過敏反應的症狀有皮疹；蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
2. 胸部開始疼痛或胸痛更加嚴重。
3. 嚴重眩暈或失去知覺。
4. 肝臟症狀：尿色深、感到疲倦、沒有飢餓感、胃部不適或胃部疼痛、糞便顏色不深、嘔吐或者皮膚或眼睛泛黃。
5. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-724-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您