## Saxagliptin

製定日期:111年7月7日

- 一. 此藥有哪些作用?
  - 1. 此藥的作用是減低糖尿病患者的血糖含量。
- 二. 使用此藥必須注意哪些事項?
  - 1. 若您的血糖一直偏低,請勿開車。 否則發生意外的危險性會增加。
  - 1. 請遵照醫師指示檢查您的血糖。
  - 2. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
  - 3. 在經歷發燒、感染、受傷或進行手術等對身體造成 負擔的情形時,可能更難以控制血糖。身體活動、 運動或餐食改變可能也會影響血糖。
  - 4. 飲酒前, 先洽詢醫師指示。
  - 5. 遵照醫師建議的飲食和運動計畫。
  - 6. 此藥曾引發嚴重的胰腺問題(胰臟炎)。有時,這 種情況可能致命。
  - 7. 使用此類藥物曾出現一種稱為大皰性類天皰瘡的皮膚反應。若您出現水泡,或者皮膚開始破裂,請立即致電您的醫師。
  - 8. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養,請告知醫師。



T-C-0210-ED-835-04

Last Reviewed Date 2020-03-03 UpToDate





## Saxagliptin

製定日期:111年7月7日

## 三. 副作用為何?

- 1. 可能包括:頭痛、普通感冒徵候。
- 2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作 用有疑問,請聯絡您的醫師。
- 四. 如果我忘記(錯過)一次用藥,該怎麼辦?
  - 1. 儘早把忘記用的藥用了。
  - 2. 如已接近下一次用藥時間,則跳過錯過的那次用藥 量,隨後回到正常用藥時間。
  - 3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

## 五. 我應該如何儲存此藥?

- 1. 存放於室溫下。儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
- 2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒 童和寵物都無法觸及的地方。
- 3. 扔掉未使用或過期的藥物。



T-C-0210-ED-835-04



**Last Reviewed Date** 

