Saxagliptin and Metformin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥的作用是減低糖尿病患者的血糖含量。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?



1. 請遵照醫師指示檢查您的血糖。
2. 若您的血糖一直偏低，請勿開車。否則發生意外的危險性會增加。
3. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。
4. 在經歷發燒、感染、受傷或進行手術等對身體造成負擔的情形時，可能更難以控制血糖。身體活動、運動或餐食改變可能也會影響血糖。
5. 遵照醫師建議的飲食和運動計畫。
6. 您的糞便中可能會殘留類似藥錠的東西。這是正常現象，無需擔憂。若您尚有任何疑問，請洽詢醫師。
7. 若發生腹瀉或嘔吐問題，請致電聯絡您的醫師。您將需要飲用更多流質飲品，以避免流失太多體液。
8. 於高熱天氣或動態活動時，請務必小心。 喝大量的水以防止脫水。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-822-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Saxagliptin and Metformin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

9. 使用此類藥物曾出現一種稱為大皰性類天皰瘡的皮膚反應。有時患者需要到醫院進行檢查。若您出現水泡，或者皮膚開始破裂，請立即致電您的醫師。
10. 曾有人在服用類似此藥的其他藥物後出現嚴重且有時致命的胰腺問題（胰臟炎）。
11. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。
12. 已有接受此藥後出現心臟衰竭的病例發生。若您感到疲倦或出現呼吸短促、體重明顯增重，或雙手或雙腿腫脹，應立即致電醫師求助。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-822-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Saxagliptin and Metformin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：噁心或嘔吐、腹瀉、氣體、感覺疲倦或虛弱、頭痛、普通感冒徵候、喉嚨痛、流鼻涕或鼻塞。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間，除非您的醫師有其他指示。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-822-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您