Quetiapine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 該藥用於治療雙相障礙。
2. 藥的作用是治療精神分裂症。
3. 此藥的作用是治療抑鬱症。
4. 此藥可能因其他原因而給您服用。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
2. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。
3. 服用此藥曾出現白血球計數偏低的問題。這可能會導致感染的機率升高。若您出現感染徵候，例如發燒、發冷或喉嚨痛，請立即致電聯絡您的醫師。
4. 曾發生使用此類藥物後出現高血糖症或糖尿病、高膽固醇與體重增加的案例。這些可能會提高心臟與腦血管疾病的機率。
5. 若您有高血糖的症狀，如意識惑亂、嗜睡、口渴感增強、飢餓、頻尿、潮紅、呼吸急促或呼吸中帶有水果氣味等，請告知您的醫師。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-824-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Quetiapine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

7. 可能會發生一種稱為抗精神藥物惡性症候群 (NMS) 的嚴重健康問題，而且有時候會有致命風險。 若您出現任何發燒、肌肉痙攣或僵硬、頭昏、嚴重頭痛、意識惑亂、思維變化、心動過速、心跳異常或大量出汗問題，請立即聯絡您的醫師。

8. 使用此藥時可能會感到頭暈、嗜睡或平衡感變差。這些症狀可能會導致跌倒。
9. 服用此藥後發生便秘是正常現象。有時會發生腸阻塞。在極罕見情況下，腸阻塞對於將此藥與（導致胃腸道蠕動緩慢的）其他藥物併用的病患可能是致命的。若您有任何疑問，請告知醫師。
10. 患癡呆症的老年成人使用類似此藥的藥物後，有出現中風次數增多的病例發生。有時，這類副作用可能危及生命。此藥尚未獲准用於治療因癡呆症引起的精神疾患。
11. 此藥可能會影響生育能力。停藥後將會恢復正常。
12. 若於懷孕後期服用此藥，可能會導致新生兒出現無法控制的肌肉活動和戒斷症狀。
13. 曾經發生孩童與青少年使用此藥後出現高血壓案例。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-824-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Quetiapine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：感覺頭暈、想睡、疲倦或虛弱、頭痛、感覺緊張、容易興奮、便秘、口乾、增強食慾、體重增加、噁心或嘔吐、胃痛、背痛、鼻子不通氣。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
4. 若您忘記用藥且不確定該如何做時，請致電聯絡醫師。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 室溫避光乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-824-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您