Silodosin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 對於男性，此藥用來治療攝護腺肥大癥狀。
2. 此藥可能因其他原因而給您服用。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。

2. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。
3. 若您正要接受白內障手術或其他眼部手術，請與醫師商洽因應對策。



4. 做直腸檢查（檢查前列腺）和血液檢查(PSA 檢查)。請洽詢醫師。
5. 此藥目前尚未核准用於兒童。 請與醫師商洽相關事項。
6. 此藥未獲得批准用於婦女。若您是使用此藥的女性，且您已懷孕、計畫懷孕或正在以母乳餵養幼兒，請告知醫師。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-827-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Silodosin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：性高潮時精液較少或沒有精液、眩暈。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起應儘早隨用餐送服錯過的藥物。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 避光乾燥處。不要儲存在浴室。
3. 將藥物放在兒童無法觸及的地方。

T-C-0210-ED-827-04

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您