Montelukast

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於防止運動誘發性呼吸問題。
2. 此藥用於治療或預防氣喘。
3. 此藥用於減輕過敏癥狀。
4. 此藥不用於治療急性發作的呼吸短促。使用急救吸入型藥物。請和醫師討論。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 若您患有苯酮尿症 (PKU)，請告知您的醫生。某些藥品含有苯丙胺酸 (phenylalanine)。
2. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。
3. 若您服用此藥治療氣喘或過敏，不要再服一劑來防止運動誘發性呼吸問題。
4. 若有氣喘或正在服用阿斯匹靈，問題將更嚴重，因此在服用此藥時，請避免服用阿斯匹靈及非類固醇類消炎藥（NSAID）。
5. 若您的呼吸問題惡化、急救吸藥器沒有發揮作用或需要使用急救吸藥器的頻率提高，請立即聯絡您的醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-828-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Montelukast

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

6. 若您從類固醇轉換到此藥，請勿突然停用類固醇。類固醇的劑量可能需要慢慢降低，以避免副作用。請洽詢您的醫師。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：感覺緊張、容易興奮、心神不定、頭痛、入睡困難、胃痛或腹瀉、頻繁排尿 (頻尿) 。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 室溫下避光。儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-828-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您