Sitagliptin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥的作用是減低糖尿病患者的血糖含量。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 若您的血糖一直偏低，請勿開車。否則發生意外的危險性會增加。
2. 請遵照醫師指示檢查您的血糖。
3. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。
4. 遵照醫師建議的飲食和運動計畫。
5. 在經歷發燒、感染、受傷或進行手術等對身體造成負擔的情形時，可能更難以控制血糖。身體活動、運動或餐食改變可能也會影響血糖。
6. 若已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。
7. 服用此類藥物的病患曾出現心臟衰竭情形。若您曾有心臟衰竭或腎臟問題。若您感到疲倦或出現呼吸短促、體重明顯增重，或雙手或雙腿腫脹，應立即致電醫師求助。
8. 曾出現腎臟疾病。有時可能需要住院或透過透析治療腎臟疾病。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-830-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Sitagliptin

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

3. 使用此類藥物曾出現一種稱為大皰性類天皰瘡的皮膚反應。有時患者需要到醫院進行檢查。若您出現水泡，或者皮膚開始破裂，請立即致電您的醫師。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：頭痛、普通感冒徵候、鼻或咽喉刺激。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 室溫乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-830-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您