Sitagliptin and Metformin

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

- 一. 此藥有哪些作用?
 - 1. 此藥的作用是減低糖尿病患者的血糖含量。
- 二. 使用此藥必須注意哪些事項?
 - 1. 若您的血糖一直偏低,請勿開車。否則發生意外的 危險性會增加。
 - 2. 請遵照醫師指示檢查您的血糖和血液檢驗。
 - 3. 可能出現低血糖。當此藥與其他糖尿病治療藥物併 用時,這類風險會更高。症狀可能包括頭昏、頭痛、

嗜睡或感覺虛弱無力、顫慄、心動 過速、意識惑亂、飢餓感或出汗。 若出現任何上述症狀,可以服用葡 萄糖錠、葡萄糖液或果汁。




- 4. 在經歷發燒、感染、受傷或進行手術等對身體造成 負擔的情形時,可能更難以控制血糖。身體活動、 運動或餐食改變可能也會影響血糖。
- 5. 於高熱天氣或動態活動時。喝大量的水以防止脫水。
- 6. 若您無法透過嘴巴喝飲料或感覺胃部不適、嘔吐或 持續不斷的腹瀉, 您須避免脫水以免引發腎臟問題。







T-C-0210-ED-829-04





Sitagliptin and Metformin

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?


- 7. 曾出現腎臟疾病。有時可能需要住院或透過透析治療腎臟疾病。
- 8. 對已達生育年齡而尚未排卵的女性,會有懷孕可能。若您希望避免懷孕,在服用此藥期間採用避孕方法來避孕。
- 9. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養,請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。
- 10.使用此類藥物曾出現一種稱為大炮性類天皰瘡的皮膚反應。有時患者需要到醫院進行檢查。若您出現水泡,或者皮膚開始破裂,請立即致電您的醫師。
- 11.服用此類藥物的病患曾出現心臟衰竭情形。若您曾有心臟衰竭或腎臟問題,請告知您的醫師。若您感到疲倦或出現呼吸短促、體重明顯增重,或雙手或雙腿腫脹,應立即致電醫師求助。







T-C-0210-ED-829-04





Sitagliptin and Metformin

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何?

- 1. 可能包括: 胃痛或胃灼熱、噁心或嘔吐、腹瀉、氣體、感覺疲倦或虛弱、頭痛、普通感冒徵候、鼻或咽喉刺激。
- 2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作 用有疑問,請聯絡您的醫師。
- 四. 如果我忘記(錯過)一次用藥,該怎麼辦?
 - 1. 儘早把忘記用的藥用了。
 - 2. 如已接近下一次用藥時間,則跳過錯過的那次用藥量,隨後回到正常用藥時間。
 - 3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
- 五. 我應該如何儲存此藥?
 - 1. 存放於室溫下。
 - 2. 儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
 - 3. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒 童無法觸及的地方。



T-C-0210-ED-829-04

