Estrogens (Conjugated/Equine) and Medroxyprogesterone

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1.此藥用於預防更年期女性罹患骨質疏鬆症。

2.用於治療停經後（更年期）婦女雌激素含量偏低綜合徵。

3.此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 若您患有糖尿病，將需密切觀察您的血糖變化。
2. 使用此類藥物曾出現高血壓的情形。遵照醫師指示進行按照醫師跟您說的進行血液檢驗和骨質密度檢測。
3. 務必定期做乳房檢查和婦科檢查。您也必須依照指示進行乳房自我檢查。
4. 避免吸菸。 吸菸提高了心臟疾病的機會。請向您的醫師洽詢。

5. 此藥可能會提高血液凝塊、中風或心臟病發作的風險。若您需要長時間靜止不動，例如長途旅行、手術後或生病時需臥床靜養，請告知您的醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-832-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Estrogens (Conjugated/Equine) and Medroxyprogesterone

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

6. 在一些癌症病患當中，服用這樣的藥物會出現高血鈣。若您有高血鈣的症狀，比如虛弱、意識惑亂、疲倦、頭痛、胃部不適或嘔吐、便秘或骨骼疼痛，請立即致電聯絡您的醫師。
7. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。 您將必須討論對嬰兒造成的風險。
8. 曾經發生使用此藥後出現三酸甘油酯水平較高的病例。若您曾出現過三酸甘油酯水平較高的情況，請告知您的醫師。
9. 若您時常喝葡萄柚汁或吃葡萄柚，請告知您的醫師。
10. 此藥可能會讓您臉部的皮膚出現暗斑。避免日曬、太陽燈及日曬床。使用防曬乳液並穿防曬的衣物和太陽眼鏡。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：疲倦或虛弱、背痛、頭痛、噁心或嘔吐、氣體、胃痛或痙攣、鼓脹感、乳房增大、乳房觸痛、掉頭髮。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-832-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Estrogens (Conjugated/Equine) and Medroxyprogesterone

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放於室溫下。
2. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
3. 將藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-832-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您