# **Oseltamivir**

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

## 一. 此藥有哪些作用?

- 1. 此藥用於治療或預防流行性感冒(流感)。
- 2. 此藥可能因其他原因而給您服用。請洽詢您的醫師。

## 二. 使用此藥必須注意哪些事項?

#### 1. 所有劑型:

- a. 此藥不可用來取代流感預防針。若醫師建議您打流感預防針, 您就需要打。
- b. 此藥不治療一般感冒。
- c. 此藥無法防止將流感傳染給其他人。
- d. 若在使用此藥後接受流感疫苗,之前請告知醫師。 若您剛接受流感疫苗,在使用此藥之前,請告知醫師。
- a. 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養,請告知醫師。 您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。

#### 2. 藥液(混懸液):

a. 此藥品內含山梨糖醇,可能會導致果糖不耐症的患者產生胃 部不適和腹瀉。請洽詢醫師。

# 三. 副作用為何?

- 1. 可能包括:腹瀉、胃部不適或嘔吐、頭痛
- 2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作 用有疑問,請聯絡您的醫師。



T-C-0210-ED-823-04

**Last Reviewed Date** 2020-03-03 UpToDate



## **Oseltamivir**

製定日期:102年9月11日

修定日期:109年7月1日(第4版)

## 四. 如果我忘記(錯過)一次用藥,該怎麼辦?

- 1. 儘早把忘記用的藥用了。
- 2. 如距離下一次用藥時間不到 2 小時,則跳過錯過的 那次用藥量,隨後回到正常用藥時間。
- 3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

#### 五. 我應該如何儲存此藥?

#### 1. 膠囊:

- a. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
- b. 若將膠囊製成水劑(混懸液),請儲存於冰箱內。請勿冷凍儲存。任何未用的藥物請於35天後丟棄。也可儲存在室溫下。若儲存在室溫下,5天後請將任何未用的藥物丟棄。

#### 2. 藥液(混懸液):

- a. 將液體存放於冰箱內。 切忌冷凍。17 天後丟棄所有未用部份。
- b. 也可儲存在室溫下。 若儲存在室溫下, 10 天後請將任何未 用的藥物丟棄。
- c. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。

#### 3. 所有劑型:

a. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物 都無法觸及的地方。



T-C-0210-ED-823-04

**Last Reviewed Date** 2020-03-03 UpToDate

