Atenolol

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療高血壓。
2. 用於治療某些患者的長期胸痛（穩定性心絞痛）。
3. 此藥在心臟病發作後使用，以降低死亡機會。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。

2. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。
3. 按照醫囑檢查血壓和心率。
4. 使用可能升高血壓的非處方藥前請洽詢醫師。這包括咳嗽或感冒藥、減肥藥、興奮劑、布洛芬或類似的藥品、某種天然製品或補充劑。
5. 此藥物讓您難以判別是否出現甲狀腺功能亢進的症狀，如心動過速。若您有甲狀腺亢進的問題卻突然停藥，病情可能會加劇，請洽詢醫師建議。
6. 此藥可能會隱藏低血糖症狀。若您患有糖尿病，將需密切觀察您的血糖變化。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-842-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Atenolol

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

7. 如果您在懷孕時服用此藥物，可能會傷害腹中胎兒。若在服用此藥期間您懷孕或試圖懷孕，應立即致電醫師商洽。
8. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。您將討論對嬰兒造成的風險。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：頭暈、疲倦或虛弱。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 室溫乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-842-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您