Tenofovir

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療 B 型肝炎感染。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 您需要依照醫生的指示進行人類免疫缺乏病毒 (HIV)（愛滋病毒）檢驗。 請與您的醫師洽談。
2. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗和尿樣檢驗。
3. 此藥有極小可能造成肝臟腫大及血液中酸性的積累。有時，這種情況可能致命。對於女性、體重過重人士與長期服用此類藥物者，有較高的引發風險。
4. 若您已懷孕、計畫懷孕或母乳餵養，請告知醫師。
5. 此藥並無法預防如人類免疫缺乏病毒 (HIV)（愛滋病毒）或肝炎等經由血液或性愛傳播之疾病的傳播。請勿在不使用膠乳或聚氨酯保險套的情形下進行任何形式的性愛。請勿共用針頭或其他如牙刷或刮鬍刀等物品。

6. 曾經發生使用此藥後出現腎臟問題（例如腎衰竭）的情形。若您曾有過腎臟問題，請告知您的醫師。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-843-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Tenofovir

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：頭痛、胃痛或胃灼熱、感覺疲倦或虛弱、咳嗽、噁心、背痛、關節痛、腹瀉。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。 若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。 請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 一旦想起錯過的藥物，即應儘早隨食物吞服。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 放在原始容器內室溫下儲存。
2. 鎖緊上蓋。
3. 儲存在乾燥處。 不要儲存在浴室。
4. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-843-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您