Ticagrelor

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 用於減少某些人心臟病發作、中風與死亡的機率。
2. 用於降低在心臟中置入支架後發生支架阻塞的機率。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 您可能會更容易出血。
   小心避免受傷。使用軟毛
   牙刷和電動剃鬚刀。

2. 若您跌倒或不慎受傷，或者撞到
   頭部，請立即聯絡您的醫師。即
   使您感覺無恙，也請洽詢醫師建議。
3. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知
   醫師。 您將必須討論在懷孕期間
   服用此藥對您帶來的益處與風險。

三. 副作用為何？

1. 出血症狀：嘔血或咳血；似咖啡渣的
   嘔吐物；血尿；黑色、紅色或黑便；
   牙齦出血；陰道異常出血；無理由出現瘀傷或瘀傷
   變大；或者您無法止住的出血。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-845-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Ticagrelor

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

2. 身體某一側虛弱無力、說話或思維困難、平衡感改變、臉部某一側下垂或視力模糊。
3. 其它還有：嚴重頭痛、氣短、心動過緩、心跳異常。
4. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 跳過未服的藥物，繼續按照您的療程服藥。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 於室溫下儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-845-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您