Tofacitinib

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥用於治療部分類型的關節炎。
2. 此藥用於治療潰瘍性大腸炎。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 若您時常喝葡萄柚汁或吃葡萄柚，請告知您的醫師。
2. 有些病毒感染例如帶狀皰疹會因為此藥而再度發作。若您曾有帶狀皰疹之類的病毒感染，請告知您的醫師。請洽詢您的醫師。
3. 可能會進行 B 型或 C 型肝炎檢驗。服用此藥期間，B 型或 C 型肝炎感染可能會惡化。
4. 按照醫師跟您說的進行血液檢驗。請告知醫師。
5. 曾經發生使用此藥後出現血脂肪異常症（高膽固醇）的案例。若您有任何疑問，請諮詢醫師。
6. 確保您在開始接受此藥之前即完成所有疫苗注射。
7. 若與一些疫苗同時使用此藥，可能會提高受感染的機會或讓疫苗的效果減弱。
8. 您有較高的機率會受到感染。經常洗手遠離受感染、感冒或流行性感冒的人。



Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-846-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Tofacitinib

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

9. 若您有糖尿病，請洽詢醫師。您可能比較容易發生感染。
10. 此藥可能導致生育問題。可能影響生育能力。若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。

三. 副作用為何？

1. 可能包括：頭痛、腹瀉、普通感冒徵候、鼻或咽 喉刺激。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 跳過未服的藥物，繼續按照您的療程服藥。
2. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 放在原始容器內室溫下儲存。儲存乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將藥物放在兒童無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-846-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您