Imipramine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

一. 此藥有哪些作用?

1. 此藥的作用是治療抑鬱症。
2. 此藥用於預防孩童尿床。
3. 此藥可能因其他原因而給您服用。

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

1. 可能需要數週才能完全見效。
2. 在進行某些手術前，需按照醫囑停用此藥。
3. 在您明白該藥物對您的影響之前，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
4. 為降低頭暈或昏厥的機率，若您已坐下或躺下一段時間，應非常緩慢地站起。上下樓梯時請小心。
5. 您若需停用此藥物，應該按醫師囑咐緩慢停用，不然可能會有較高的副作用發作風險。
6. 若您患糖尿病，將需密切觀察您的血糖變化。
7. 若您有高血糖或低血糖的症狀，如呼吸中帶有水果氣味、頭昏、呼吸急促、心動過速、意識惑亂、嗜睡、感覺虛弱無力、潮紅、頭痛、口渴感或飢餓感增強、頻尿、顫慄或出汗等，請告知您的醫師。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-847-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Imipramine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

二. 使用此藥必須注意哪些事項?

8. 若您對 tartrazine（酒石黃）過敏，請洽詢醫師。某些藥品含有酒石黃。
9. 您可能需在開始使用此藥前及用藥期間接受心電圖 (ECG) 檢查。 請與醫師商洽相關事項。
10. 可能會發生一種稱為血清素症候群的嚴重健康問題，而且有時會有致命風險。若您也在服用其他特定藥物，風險可能會更高。若您有情緒急躁、平衡感改變、意識惑亂、幻覺、發燒、心跳過快或異常、潮紅、肌肉抽搐或僵硬、癲癇發作、發抖或顫抖、大量出汗、嚴重腹瀉、胃部不適或嘔吐或重度頭痛的情況，請立即致電聯絡您的醫師。
11. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。您將必須討論在懷孕期間服用此藥對您帶來的益處與風險。

8. 於高熱天氣或動態活動時，請務必小心。 喝大量的水以防止脫水。
9. 你很容易曬傷。避免陽光、太陽燈和日曬床照曬。使用防曬乳液；穿防曬的衣物和太陽眼鏡。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-847-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您

Imipramine

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)

三. 副作用為何？

1. 可能包括：感覺頭暈、想睡、疲倦或虛弱、口乾、便秘、腹瀉、胃痛、胃部不適、嘔吐或飢餓感降低、味覺能力的改變、胃痙攣、體重增重或減重、出汗過多、臉潮紅、頭痛。
2. 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。

四. 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。
4. 若您是每天睡前使用 1 劑的話，一旦錯過用藥，請勿在隔天早上補用。

五. 我應該如何儲存此藥？

1. 存放在室溫下，避免陽光直射。儲存在乾燥處。不要儲存在浴室。
2. 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。

Last Reviewed Date
2020-03-03 UpToDate

T-C-0210-ED-847-04

天成醫療體系 中壢天晟醫院 楊梅天成醫院 關心您